Tav. 1.m Biocenosi marine e terrestri - interfaccia terra-mare



E



A

A

B



B

C

E

D



C



D

Faro

Parco Nazionale dell'Asinara

Piano del Parco Nazionale dell'Asinara

Tav. 1.m Biocenosi marine e terrestri - interfaccia terra-mare

scala 1:4.000

Coordinatore:
Giovanni Mastrolorito

Referente per il sistema ambientale
Nicola Secchi

Referente per il sistema storico-culturale ed insediativo
Giangiuliano Monaco

Consulenti per il sistema ambientale
Rossella Filigheddu
Ermanuela Farina
Luca Mulas
Giacomo Oggiano
Paolo Orrù
Marco Porcheddu
Aldo Zanella

Consulenti per il sistema storico-culturale ed insediativo
Francesco De Rosa
Pierpaolo Congiatu

Consulenti per il sistema agricolo
Antonella Falqui
Antonello Pasquali

Consulenti per il sistema cartografico e GIS
Maurizio Minchilli
Salvatore Allama
Gianluca Cocco

Consulenti per il sistema della comunicazione e partecipazione
Annalisa Claudino
Ivan Ellero
Alessandro Pisanelli

Consulenti per il sistema normativo
Antonio Sanna

Collaboratori
Giovanni Carru
Gianluca Idini
Giuliana Fara
Giovanni Mura
Progetto3D
MAM Italia
Roberto Spotto
Francesco Villaro

Ottobre 2005

A - CALA D'ARENA
B - CALA DEI PONZESI
C - CALA REALE
E - CALA SANT'ANDREA
D - CALA DI SGOMBRO DI FUORI

BIOCENOSI MARINE

- Prateria a Posidonia oceanica
- Biocenosi fotofile delle superfici in roccia infralitorali superiori in moda calma (RIPC)
- Biocenosi dei substrati duri circalitorali a grandi fanerogame
- Biocenosi del detritico costiero
- Biocenosi delle sabbie fini infralitorali di moda calma (SM)
- Mosaico a Posidonia oceanica e roccia o Posidonia su roccia
- Biocenosi emifotofile delle superfici in roccia infralitorale (RIHC)
- Biocenosi a rodofee incrostanti delle rocce circalitorali, precoralligeno (pC)
- Biocenosi scafile delle superfici subverticali in roccia e delle grotte semi oscure (GSO)
- Biocenosi fotofile delle superfici in roccia infralitorali superiori in moda battuta (RIPB)
- Prateria a cymodocea nodosa
- Matte morte a posidonia oceanica
- Biocenosi delle sabbie infralitorali di moda battuta (DM)
- Biocenosi fotofile delle superfici in roccia mediolitorale
- Coralligeno
- Prateria mista a Caulerpa-Cymodocea (SVMC)
- Caulerpa prolifera su matte morta
- Prateria a Posidonia oceanica in regressione per ancoraggi e pesca a strascico
- Cymodocea e foglie morte di Posidonia
- Biocenosi delle sabbie e ghiaie fini infralitorali
- Biocenosi delle sabbie fini ben calibrate (SFBC)
- Biocenosi delle sabbie limose di moda calma (SVMC)
- Concrezioni a Lithophyllum lichenoides
- Biocenosi delle sabbie medie bioclastiche dei canali intramatte (DC)
- Patella ferruginea
- Accumuli di foglie morte di Posidonia
- Banquettes
- Caulerpa racemosa

BIOCENOSI TERRESTRI

- Vegetazione delle dune
- Vegetazione degli ambienti d'acqua dolce
- Aggruppamento a Pistacia lentiscus
- Euphorbio characiae-Juniperetum turbinatae
- Roccia nuda
- Vegetazione sommersa
- Vegetazione degli ambienti salmastri
- Zona afitolica
- Senecioni leucanthemifolii-Nananthetsum perpusillae
- Vegetazione delle falesie
- Euphorbio pithyusae-Helchrysetum microphylli
- Dactylo hispanicae-Camphorosmetum monspeliacae
- Asphodelo microcarpi-Brachypodietum ramosi